

Een klare kijk op ooglidchirurgie



BRUSSELS
EYE DOCTORS



Ooglid chirurgie

Een klare kijk op ooglidchirurgie

U herinnert zich hoe u eruit zag toen u 20 was : eigenlijk zo'n beetje als nu, maar dan jonger. Het is hetzelfde gezicht, maar het heeft iets aan vorm verloren.

We erkennen het probleem van huidveroudering en we doen alles om onze huid te verzorgen maar een gezonde voeding en levensstijl, sport, de liters water en dure crèmes volstaan niet meer.

De huid droogt uit en verliest zijn elasticiteit. Het gelaat wordt minder gaaf en er ontwikkelen zich rimpeltjes.

De huid van de oogleden wordt vaak 'hangerig' en de vetpockets die zich in de oogkas bevinden worden meer en meer prominent.

Dit geeft aanleiding tot de klassieke volle bovenste oogleden, of wallen onder de ogen.

Wij stellen enkele therapeutische en chirurgische opties voor, om het effect dat de tijd op uw gelaat heeft te minimaliseren. Uiteraard is een goed vooronderzoek van fundamenteel belang, om voor elke patiënt afzonderlijk de beste behandelingsmogelijkheden te bespreken.



Behandeling van rimpels

Het product bij uitstek voor de behandeling van rimpels is **BotulineToxine** of **Botox®**. Het product verzwakt de spiergroepen die de rimpels veroorzaken. Het is dus heel belangrijk te weten welke spiertjes rimpels veroorzaken om een correct en natuurlijk resultaat te verkrijgen. Tijdens de rimpelbehandeling bestaat de kunst erin een zekere mimiek te behouden en niet alle spiertjes te verzwakken.


De Botox® injecties zijn veilig en vrijwel pijnloos.

Het maximale effect wordt na 10 à 14 dagen bereikt en houdt 4 tot 6 maanden aan.

Doordat de activiteit van de spieren afneemt, kan Botox® ook voorkomen dat zich diepe, zichtbare rimpels ontwikkelen en aldus preventief werken.

Welke zones komen in aanmerking voor een huidverjonging met Botox®?


- **Fronsrimpels:** Het herhaaldelijk fronsen van de wenkbrauwen leidt tot diepe, blijvende rimpels.
- **Voorhoofdrimpels:** De horizontale lijnen aan het voorhoofd of "denkrimpels" zijn een zeer goede indicatie voor Botox®.
- **Kraaienpootjes:** De waaivormige fijne expressie rimpeltjes aan de zijkanten van de ogen.



Esthetische bovenooglidcorrectie


Het uitzicht van je ogen en oogleden is vaak het eerste wat anderen aan je gezicht opmerken. Naast hun beschermende functie, zijn de oogleden ontgensprekelijk een belangrijk onderdeel van de aantrekkelijkheid van je aangezicht.

Bij een bovenooglidblefaroplastie wordt de overtollige huid verwijderd (soms ook het overtollige vet), zodanig dat u opnieuw een frissere blik krijgt.



Esthetische onderooglidcorrectie



Door de zwaartekracht kunnen ook de onderoogleden opvallend gaan "hangen" of kan vet vanuit de oogkas naar voor puilen. Dit kan gecorrigeerd worden door een onderooglidblepharoplastie.



6

Entropioncorrectie

Een ooglid kan door laksiteit soms naar binnen draaien, waardoor de wimpers tegen het hoornvlies gaan schuren en er pijn, irritatie, last van het licht en een zanderig gevoel ontstaat. Door de krassende wimpers kan het hoornvlies beschadigd raken, waardoor het zicht blijvend kan afnemen. Deze aandoening, genaamd **entropion**, kan met een kleine functionele ingreep verholpen worden.




7

Ectropioncorrectie

Een **ectropion** is een naar buiten gedraaid ooglid. Hierdoor wordt de rode binnenzijde van het ooglid zichtbaar, hetgeen cosmetisch storend is.

Vaak is het oog geïrriteerd omdat het minder goed sluit. Soms kan hierdoor beschadiging van het hoornvlies optreden. Ook kan het oog gaan tranen doordat het afvoerkanaaltje van de traanwegen geen contact meer maakt met het oog.

Wanneer een ectropion klachten veroorzaakt, is het dan ook verstandig om deze afwijking met een kleine functionele operatie te laten verhelpen.




Ptosiscorrectie

Een bovenooglid ptosis is een aandoening waarbij het bovenooglid naar beneden is gezakt. Hierdoor kan het zicht belemmerd worden of kan een cosmetisch storende asymmetrie tussen de bovenoogleden ontstaan.

Een hangend ooglid ('ptosis') dat op volwassen leeftijd ontstaat is meestal het gevolg van het losraken van de aanhechting van deze spier in het ooglid, of van uitrekken van het pezige deel van de levatorspier. Op zich functioneert de spier dus goed, maar de verbinding tussen de spier en het ooglid is verslapt.

Deze afwijking kan gecorrigeerd worden door de spier weer vast te hechten aan de bindweefselplaat in het ooglid. Deze operatie kan best onder plaatselijke verdoving worden verricht, omdat tijdens de operatie de hoogte van het ooglid moet worden beoordeeld. Wanneer er tevens een teveel aan huid in het bovenooglid aanwezig is moet dit tegelijkertijd worden gecorrigeerd, anders hangt de huid na de operatie over de rand van het ooglid heen.



Algemeen

De meeste ooglidoperaties kunnen onder plaatselijke verdoving gebeuren. Een ooglidoperatie onder plaatselijke verdoving is in het algemeen niet of nauwelijks pijnlijk. De injecties die nodig zijn voor de plaatselijke verdoving kunnen wat gevoelig zijn, maar de meeste patiënten vinden het minder pijnlijk dan bij de tandarts. Voor ingrepen onder plaatselijke verdoving hoeft u niet 'nuchter' te zijn. U mag dus normaal eten. Indien u erg gespannen bent kunt u vooraf een kalmerend middel krijgen. In dat geval wordt best begeleiding voorzien. Indien u bloedverdunders neemt, dient dit met u arts besproken te worden tijdens de consultatie.

Na de ingreep

U kan nagenoeg meteen na de ingreep het kabinet verlaten. Een verband op het geopereerde oog is meestal niet nodig. Het zicht is de eerste uren na de ingreep soms wat wazig. Daarom rijdt u beter niet zelf met de wagen. U kan wel met het openbaar vervoer naar huis.

Doe het de eerste dag na de operatie rustig aan. Daarna mag u alle normale activiteiten weer hervatten, inclusief douchen en baden. Wij raden u aan de eerste week na de ingreep niet te zwemmen.

Een zekere mate van vochtafscheiding uit de wonde is normaal, dit wijst niet op een infectie. Wanneer zich een korst op de wonde vormt, laat u die best spontaan loskomen. Dan kunt u die eenvoudig verwijderen door te deppen met een propere zakdoek. De afscheiding uit een wonde die contact maakt met het oog kan ervoor zorgen dat het oog 's ochtends dichtgeplakt is. Ook dit is normaal en ook deze afscheiding kunt u verwijderen door te deppen met een vochtige zakdoek.

De zwelling en de blauwe plekken zijn de eerste dagen het hevigst en nemen in de week daarna geleidelijk af. Meestal zijn de blauwe plekken twee weken zichtbaar. U kunt de zwelling verminderen door het geopereerde gebied de eerste 48u goed te koelen. Hiervoor zijn coldpacks in de handel. U kan er ook eentje verkrijgen bij ons, indien u dit wenst.

De pijn na ooglidoperaties is in het algemeen gering. Mocht u er toch last van hebben dan is er geen bezwaar tegen het gebruik van een pijnstillertje.

Waar gebeurt de ingreep?

Brussels Eye Doctors situeert zich vlakbij Montgomery square.
Sint-Michielslaan 12-16, 1150 Sint-Pieters-Woluwe.
Afspraken kunnen gemaakt worden via:
Tel: **+32-2-741.69.99** / e-mail: **info@vryghem.be**



Brussels Eye Doctors is opgericht door Dr. Jérôme C. Vryghem en heeft een heel moderne infrastructuur. Het kabinet is onder meer uitgerust met 2 operatiezalen: een operatiezaal voor intra-oculaire chirurgie en een laserzaal.



Brussels Eye Doctors draagt moderne en professionele optalmologie hoog in het vaandel en onderscheidt zich van andere praktijken door de kwaliteit van de geleverde diensten en uitgevoerde behandelingen. Wat telt is de tevredenheid van de patiënt en een continue evaluatie van onze diensten. Na een grondige herorganisatie en na verschillende audits uitgevoerd door Lloyd's Register Quality Assurance, heeft Brussels Eye Doctors in juli 2006 het certificaat ISO 9001: 2000 ontvangen. In juni 2009 werd met succes het ISO 9001: 2008 certificaat behaald. Meer informatie vindt u op www.brusselseyedoctors.be of www.vryghem.be

Wie verricht deze operaties ?

Het is van groot belang dat u zich laat behandelen door een arts met doorgedreven specialisatie en uitgebreide ervaring in de oculoplastische chirurgie. In ervaren handen is de kans op verwickelingen zeer beperkt.




Dr. Kathleen Leroux behaalde in 2000 met grote onderscheiding haar diploma van arts aan de KULeuven. Tijdens haar specialisatie als oogarts heeft zij zich bijzonder toegelegd in de oculoplastische chirurgie. Zij specialiseerde een jaar in Londen (MaydayHospital, Croydon). Na haar specialisatie was zij phacofellow en nadien oculoplastische fellow in het Oogziekenhuis Rotterdam. Zij ging nadien nog naar Australië om zich te vervolmaken in de oculoplastische chirurgie. Van 2006 tot 2010 was zij oculoplastisch consultant in het Middelheim Ziekenhuis Antwerpen.

Binnen Brussels Eye Doctors verricht zij nu de ooglidoperaties, zowel functioneel als esthetisch.

Terugbetaling van operaties

Esthetische ingrepen worden niet vergoed door de mutualiteit. Botox injecties worden ook niet vergoed. Bij functionele ingrepen wordt het grootste deel vergoed door de mutualiteit. Sommige aanvullende verzekeringen (DKV, AXA, AG) dragen ook bij in het REM-geld.





BRUSSELS
EYE DOCTORS

www.brusselseyedoctors.be | www.vryghem.be